

NOUS POUVONS TOUS ÊTRE DES HÉROS EN CAS D'URGENCE LIÉE À UNE BAISSÉ DU TAUX DE SUCRE DANS LE SANG. **MÊME TOI.**



Comment reconnaître une urgence liée à une baisse du taux de sucre dans le sang



Sautes d'humeur



Étourdissements



Difficulté à réfléchir et à parler



Tremblements ou transpiration



Manque de coordination



Convulsions ou perte de connaissance

Que faire

Préparation:


Trouve BAQSIMI® dans: _____

- Retirez la pellicule plastique en tirant sur la **bande rouge**
- Ouvrez le couvercle et retirez le dispositif

MISE EN GARDE: Gardez BAQSIMI dans le tube sous pellicule plastique jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. N'appuyez pas sur le piston avant d'être prêt à administrer la dose - le dispositif contient une seule dose et ne peut être utilisé qu'une fois.



Administration:




- **Tenez le dispositif** entre les doigts et le pouce



1^{re} ÉTAPE

- **Insérez doucement la tige** dans l'une des narines jusqu'à ce que le ou les doigts touchent l'extérieur du nez



2^e ÉTAPE

- **Enfoncez complètement le piston** d'un geste ferme

La dose complète est administrée lorsque la **ligne verte** n'est plus visible

Après:

- Jetez le dispositif et le tube utilisés.
- Appelez les services d'urgence pour obtenir des soins médicaux.
- Si la personne est inconsciente, tournez-la sur le côté.
- En général, les patients réagissent en l'espace de 15 minutes.
- Incitez la personne à prendre du sucre à action rapide (du jus, par exemple) dès qu'elle est capable d'avaler sans danger, puis à manger une source de sucre lent, comme des craquelins et du fromage.
- En cas de réaction allergique à BAQSIMI, appelez immédiatement les services d'urgence pour obtenir des soins médicaux. Les signes comprennent une éruption cutanée, de l'urticaire, une difficulté à respirer ou à avaler, de la transpiration, une enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge; des battements cardiaques rapides et une pression artérielle basse.

Héros d'un jour

_____ est prêt à secourir _____!
(Nom du volontaire) (Nom de l'élève diabétique)